

Telefonische bereikbaarheid

Onderstaande nummers mag u altijd bellen bij twijfels en/of vragen

Algemeen nummer UMCG: 050 3616161

* Tussen 8.30 uur en 16.30 uur:

Oncologie verpleegkundige / Verpleegkundig specialist

- Margreet van Nijen toestelnummer 69405
- Henny van Essen toestelnummer 69382
- Yvonne van Straalen toestelnummer 69376
- Jaap Feenstra toestelnummer 69400
- Sophie Bunskoek toestelnummer 69384
- Renkse Horinga toestelnummer 14029
- Sietze Oosterhuis toestelnummer 17923
- Ans Lubach toestelnummer 17920

Voor algemene vragen aan de verpleegkundigen kunt u vragen naar piepernummer 77136.

* Tussen 16.30 uur en 08.30 uur en in het weekend:

Verpleegafdeling oncologie D2VA: 050 3614436

Bij geen gehoor, graag later weer proberen of bellen naar 050 3614435

(ook als u nooit opgenomen bent geweest op verpleegafdeling D2VA)

Situaties waarin u direct telefonisch contact op moet nemen met het ziekenhuis:

Koorts:

- bij één keer koorts boven 38.5 graden
- bij twee maal achter elkaar 38 graden koorts in een tussentijd van 6 uur
- bij koude rillingen

Misselijkheid en braken:

- bij ernstig en aanhoudend braken gedurende 24 uur of langer
- bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen, donkere urine

Diarree:

- bij langer dan 24 uur aanhoudende diarree
- bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen, donkere urine

Obstipatie/Verstopping van de ontlasting:

- bij langer dan drie dagen aanhoudende obstipatie (harde ontlasting en/of verstopping)

Andere situaties waarin u direct moet bellen:

- bij aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 15 minuten)
- bij een lang aanhoudende bloedneus (langer dan 15 minuten)
- bij heviger bloedverlies tijdens menstruatie
- bij hartkloppingen en duizeligheid
- bij plotseling optredende kortademigheid, een gevoel van benauwdheid of een snelle ademhaling die u niet kunt corrigeren
- bij pijnlijke plekjes in de mond en moeite met slikken waardoor u niet kunt eten of drinken
- bij een pijnlijk en branderig gevoel bij het plassen
- bij aanhoudende pijn of een branderig gevoel op de plaats van toediening van cytostatica
- bij pijnlijke handen en voeten
- bij elk ander nieuw verschijnsel