

	Graad 1	Graad 2
Emst van de huiduitslag/huidschilfering (NCI CTCA E v3.0) ¹⁵	Maculaire of papulaire huiduitslag of erytheem zonder specifieke symptomen	Maculaire of papulaire uitslag of erytheem met pruritis of andere specifieke symptomen; gelokaliseerde huidschilfering of andere laesies < 50% van het lichaamsoppervlak
Tyverb dosering ¹ NB: De Tyverb SmPC vermeldt dat stoppen of onderbreken van Tyverb dosering kan worden overwogen voor bijwerkingen \geq graad 2. Dosering kan worden hervat met 1250 mg/dag als de toxiciteit verbetert tot \leq graad 1. Als toxiciteit opnieuw optreedt, hervat dan met 1000 mg/dag	Continueer behandeling	Continueer behandeling Indien na 2 weken niet verbeterd, onderbreek dan de behandeling gedurende maximaal 14 dagen. Hervat met 1250 mg/dag als de symptomen verminderen tot graad 0 of 1 Als de symptomen terugkomen, onderbreek behandeling tot ze verminderen tot \leq graad 1 en hervat dosering met 1000 mg/dag In enkele gevallen, kan de huidbijwerking verbeteren, zonder de therapie te onderbreken
Behandeling ⁸	<ul style="list-style-type: none"> • Raadpleeg de lokale richtlijnen • Overweeg: <ul style="list-style-type: none"> › Crèmes op waterbasis en verzachtende middelen (bij een droge huidcomponent) › Mild tot matige steroïd-crèmes (noot: lokale steroïden kunnen leiden tot irritatie/droogheid en exacerbatie van symptomen) › Lokale antibiotica (bv. dindamycine gel 1%) voor pustulaire huiduitslag › Systemische antibiotica (bv. dindamycine, tetracycline, doxycycline voor pustulaire huiduitslag) › Orale antihistaminica kunnen zinvol zijn als de laesies jeuken • Topische en orale retinoiden (bv. tretinoïne) worden niet aanbevolen (omdat de uitslag die bij Tyverb wordt gezien een pathofysiologie schijnt te hebben die verschilt van acne vulgaris)⁸ 	
Supportive Care ^{8, 19}	<ul style="list-style-type: none"> • Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht • Gebruik een breed-spectrum zonnebrandmiddel (met titanium oxide of zink oxide) met een hoge zon beschermingsfactor • Gebruik hypoallergene vochtinbrengende crème of verzachtende middelen die niet geparfumeerd zijn of conserveermiddelen bevatten (bv. vaseline) 	

Tabel 4: aanbevelingen voor management van uitslag geassocieerd met Tyverb in combinatie met capecitabine