

Atezolizumab en nab-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd triple negatief mammacarcinoom

Algemeen

Lijnen	<i>BRCAMut</i>	geen <i>BRCAMut</i> PD-L1 pos	PD-L1 neg
1e lijn	PARP remmer	taxaan-atezolizumab	taxaan of carboplatin
2e lijn	carboplatin	carboplatin	taxaan of carboplatin
vervolglijnen	taxaan, andere chemolijnen	andere chemolijnen	andere chemolijnen

Inclusie

- Triple negatief mammacarcinoom
- Eerstelijnsbehandeling (eerdere adjuvante behandeling met chemotherapie of radiotherapie met curatieve intentie wel toegestaan)
- PD-L1 expressie van 1% of meer
- WHO 0 of 1

Exclusie

- Patiënten bekend met een auto-immuunziekte (zoals ziekte van Crohn) is voorzichtigheid geboden
- Onbehandelde metastasen van centrale zenuwstelsel
- Gebruik van corticosteroïden of immuunsuppressie

To do voor start

- CT thorax/abdomen
- MRI brein
- Immunolab
- ECG
- Overweeg oncolifes immunotherapie

Schema

Medicatie	Dosis	Dag
Atezolizumab	840 mg i.v.	1, 15
Nab-paclitaxel	100 mg/m ²	1, 8 en 15
Cyclusduur	28 dagen	

Continueren tot progressie of onacceptabele toxiciteit. Als zich specifieke toxiciteit atezolizumab of nab-paclitaxel ontwikkelt, kan dit middel worden gestopt terwijl met het andere wordt doorgegaan.

Follow-up

Iedere 12 weken beeldvorming.

Controle op endocrinopathie tot 3 maanden na staken atezolizumab. CAVE late endocrinopathie.

Referenties

1. Schmid P, Adams S, Rugo HS, et al; IMpassion130 Trial Investigators. Atezolizumab and nab-paclitaxel in advanced triple-negative breast cancer. *N Engl J Med* 2018;379(22):2108-21.
2. Schmid P, Rugo HS, Adams S, et al; IMpassion130 Investigators. Atezolizumab plus nab-paclitaxel as first-line treatment for unresectable, locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer (IMpassion130): updated efficacy results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2020;21(1):44-59.

Gewijzigd: 27 augustus 2020