

Voorschrift voor medicijnen tegen de misselijkheid voor thuis

Bij de chemotherapiekuur die u krijgt is metoclopramide (*metoclopramide = Primperan®*) de eerste keus bij misselijkheid en/of braken.

Bij misselijkheidklachten

Start met 3 maal daags 1 tablet metoclopramide 10 mg voor de maaltijden. Bij onvoldoende effect kan de dosis worden verhoogd tot 3 maal daags 20 mg (= 2 tabletten). Als u de tabletten niet binnenhoudt moet u contact opnemen om zetabletten voor te laten schrijven. Metoclopramide kan worden ingenomen totdat de klachten over zijn.

Mogelijke bijwerkingen

Hieronder een overzicht van de mogelijke bijwerkingen. Als u andere bijwerkingen bemerkt dan dat hier beschreven staan, moet u altijd contact opnemen met de medische oncologie van het UMCG.

| Medicijn | Mogelijke bijwerking | Advies/uitleg |
|----------------|--|--|
| Metoclopramide | <ol style="list-style-type: none">1. Stijf gevoel in de kaak, de tong en/of de nekspieren2. Kan het reactievermogen beïnvloeden | <ul style="list-style-type: none">• Als u hier last van heeft, moet u bellen met de medische oncologie UMCG.• Pas op met deelname aan het verkeer en het bedienen van machines. |

Recept

Bij de eerste kuur ontvangt u van uw arts een recept voor metoclopramide. Vraag uw arts een nieuw recept als uw voorraad medicijnen tegen misselijkheid en braken onvoldoende is.