Tamoxifen monotherapie (postmenopauzaal)

- duur 5 jaar, als goed verdragen: 10 jaar[1]
- indicaties:
  - bij contra-indicatie voor aromatase remmer zoals significante osteoporose
  - bij mannen

Medicatie soort	Naam	Dosering	Toediening
SERM	tamoxifen	20 mg 1dd1	p.o.
plus	calciumcarbonaat/colecalciferol	500/800 mg 1dd1	p.o.
plus[2]	alendroninezuur	70 mg 1x/wk	p.o.
	Of:		
	zolendroninezuur	4 mg 1x/6 mnd	I.V.

Aandachtspunt

- bij gelijktijdig SSRI: gebruik venlafaxine (relatief zwakke CYP2D6 remmer)[3]

Referenties

1. Davies et al: Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen receptor-positive breast cancer: ATLAS, a randomised trial. Lancet. 2013 Mar 9;381(9869):805-16
2. Coleman et al: Effect of bisphosphonate treatment on recurrence and cause specific mortality in women with early breast cancer: a meta-analysis of individual patient data from randomized trials. SABCS 2013, S4-07
3. Sideras et al. JCO 2010; 28: 2768-76